مقرر التقانات الحيوية
(الجزء النظري)
السنة الرابعة، قسم المحاصيل الحقلية

د. نور علي

مدرس في قسم المحاصيل الحقلية

المحاضرة الأولى تقنيات الكشف عن المجين

مقدمة

- لكل علم من العلوم مراحل تطور متتالية عبر العصور ولعل الذي يثير الجدل من العلوم اليوم هو علم
- التقانة الحيوية Biotechnology والاسم الشائع له التكنولوجيا الحيوية
- يظن الكثير بأنه علم حديث إلا أنه يرجع إلى العصور القديمة حيث استخدمه المصريون القدماء منذ حوالي 4000 سنة قبل الميلاد عندما استخدموا الخميرة في إنتاج الخبز،
- ومع ذلك ظهر مصطلح التقانة الحيوية لأول مرة في عام 1919 بواسطة المهندس المجري Karl Ekery والذي يشير إلى إنتاج المنتجات (غذاء، مشروبات، مواد كيميائية) من المواد الخام بمساعدة الكائنات الدقيقة وهو ما يشار إليه الآن بالتقانة الحيوية التقليدية وبدخول الهندسة الوراثية بدأ عصر التقانة الحيوية الحديثة.

*Word 'biotechnology' coined by Hungarian immigrant Karl Ereky.

*1919

المحاضرة الأولى

تقنيات الكشف عن المجين

مقدمة

يتكون مصطلح Biotechnology من مقطعين الأول Bio و هو مشتق من الكلمة اللاتينية "Bios" بمعنى الحياة أما الثاني Technology بمعنى الطريقة المنظمة لعمل الأشياء.

حصل التطور الكبير في مفهوم التقانة الحيوية في الستينيات من القرن الماضي نتيجة اكتشاف المادة

الوراثية DNA بتفاصيلها الدقيقة (الصبغيات ، المورثات، الأسس الأزوتية) و كيفية ترميز

المورثات للبروتينات ، أما المحطة الأكثر أهمية للتقانة الحيوية بدأت مع تطور تقانات التعامل

مع DNA ودخول العلوم الحيوية عصر تقانة DNA المأشوب recombinant DNA

technology (إنتاج البروتينات العلاجية مثل الأنسولين بالاعتماد على الجراثيم وذلك عن طريق

تأشيب بلاسميد الجرثوم بالمورثة البشرية المسؤولة عن اصطناع الأنسولين وبالتالي مع تضاعف

بلاسميد الجرثوم وتعبيره عن هذه المورثة سنحصل في النهاية على الأنسولين)

المحاضرة الأولى

تقنيات الكشف عن المجين

مقدمة

The Inventor

“We are the recipients of scientific method. We can each be a creative and active part of it if we so desire.”

Kary Mullis (1983)

<http://www.42hook.com/?p=12229>

- إن التطور في مجال التكنولوجيا الحيوية والذي يقوم على التعامل مع الحمض النووي (DNA) بشكل أساسي، استدعى العلماء للبحث عن طريقة أو تقنية مماثلة تقوم على مضاعفة كمية الحمض النووي (DNA) بشكل كبير
- فكان هناك عدة محاولات لتنشيط الخلية على الانقسام المستمر بإضافة عوامل النمو Growth factors، ولكن هذه الطريقة لم تكن ذات جدوى لأسباب كثيرة.
- إلى أن توصل العالم Kary Mullis في عام 1985 بنشر اختراعه لتقانة PCR فكانت هذه التقانة بوابةً لكثير من التطورات المتسارعة في مجال التكنولوجيا الحيوية.
- من أهم الأسباب التي ساعدت هذه التقانة على الانتشار عدم اعتمادها على النظام الحيوي (أي الخلية) و التحكم بكمية الحمض النووي (DNA)، أي أنها طريقة لنسخ الحمض النووي في المختبر لذلك فهي تقانة حيوية لاستنساخ قطعة محددة من الحمض النووي بعد استخلاصها من خلايا أو سوائل الجسم و مضاعفة إنتاجها لكي يتسنى إجراء الاختبارات و الفحوصات الإضافية عليها.

المحاضرة الأولى

تقنيات الكشف عن المجين

تقانة (PCR)

Polymerase Chain Reaction

تفاعل البلمرة المتسلسل

◦ هي طريقة تستخدم على نطاق واسع لتكوين ملايين النسخ من عينة معينة من الحمض النووي بسرعة ، مما يسمح للعلماء بأخذ عينة صغيرة جداً من الحمض النووي وتضخيمها إلى كمية كبيرة بما يكفي للدراسة بالتفصيل.

◦ تعد هذه التقانة سريعة, وسهلة, وحساسة وأتوماتيكية و هي تحتاج إلى توافر مواد معينة لكي يحدث التفاعل وهي:

البادئات
Primers

عبارة عن
نيكليوتيدات قصيرة
(bp 30-18)

قادرة على الارتباط
مع الأسس الأزوتية
للحمض النووي
المراد تضخيمه

البادئات غنية
بالغوانين C و
السيٲوزين G (من
%60-40)

يجب حساب درجة الحرارة
الملائمة للبادئات.

النيوكليوزيدات
ثلاثية الفوسفات
منقوصة الأوكسجين

ما يعرف اختصاراً بـ
dNTPs

(dATP, dCTP,
dGTP, dTTP)
Deoxynucleoside
triphosphates

أنزيم التكتيف
البوليميراز
Polymerase

مقاوم للحرارة
المرتفعة

أهمها
Taq
Polymerase

هذا الإنزيم مسؤولاً
عن تضاعف
الحمض الريبي
النووي منقوص
الأوكسجين

محاليل واقية
Buffers

شوارد مناسبة،
أهمها شاردة
المغنيزيوم
Mg²⁺ التي تعد
عامل متمم Co-
factor لأنزيم
البوليميراز.

المحاضرة الأولى

تقنيات الكشف عن المجين

تقانة (PCR)

Polymerase Chain Reaction

تفاعل البلمرة المتسلسل

◦ يتم تضخيم قطعة من الحمض الريبي النووي منقوص الأوكسجين باستخدام جهاز التدوير الحراري الآلي Thermocycle وذلك للتحكم بدرجة حرارة التفاعل بشكل دقيق و متتالي ويقوم هذا الجهاز بتغيير درجة الحرارة بشكل سريع، لأن تغيير درجة الحرارة هو الأساس الذي تقوم عليه فكرة هذه التقانة. يتم التضخيم بعدد من الدورات يتراوح بين 25-40 دورة و تتكون كل دورة PCR من ثلاث مراحل كالآتي:

1. Denaturation

2. Primers Annealing

3. Extension

المحاضرة الأولى

تقنيات الكشف عن المجين

تطبيقات تقانة (PCR) Polymerase Chain Reaction

في مجال
الطب
الشرعي

مشروع
الخارطة
الوراثية
البشرية
Human)
genome
(project

تحديد المورث
المطلوب من
خليط من
المورثات.

الحصول على
الحمض
النووي
المكمل
(cDNA)

معرفة طول
الحمض
النووي
(DNA).

تحديد تتابع
النكليوتيدات
في الحمض
النووي
(DNA
sequencer)

تحديد البصمة الوراثية

الكشف عن الطفرات الوراثية

هو العنصر الأهم في عملية
الاتحادات الجديدة للحمض
النووي

Recombinant)

الحمض الريبي النووي
منقوص الأوكسجين) حيث
يقوم PCR بتضخيم المورث
المراد إدخاله على البلاسميد
أو الحمض النووي
(DNA) المضيف

وذلك عن طريق وضع بادئ
خاص للطفرة لتضخيم
المورث الخاص بها ومنه
نقوم بمعرفة المرض إذا كان
على زوجي الصبغيات أو على
إحدهما (allele).

المحاضرة الأولى

تقنيات الكشف عن المجين

النسخ العكسي المترافق مع التضخيم بواسطة Tag polymerase تقنية RT-PCR
Reverse transcription polymerase chain reaction

- هي تقنية معملية تجمع بين النسخ العكسي للحمض النووي RNA إلى DNA (يسمى في هذا السياق DNA التكميلي أو cDNA, complementary DNA) وتضخيم أهداف الحمض النووي المحددة باستخدام تفاعل البلمرة المتسلسل (PCR)
- و تعد تقنية RT-PCR ذات أهمية في تحديد التعبير المورثي و تشخيص عوامل العدوى و تشخيص الأمراض الوراثية
- و لا بد من توافر مواد معينة لكي يحدث التفاعل:
- 1. إنزيمات النسخ العكسي: و تمثل RNA-dependent polymerases و التي تساهم في بناء الحمض الريبسي النووي منقوص الأوكسجين المتمم cDNA .
- 2. البادئات: يستخدم البادئ Oligo-dT (متعدد 12-18 أساس أزوتي) في النسخ العكسي الذي يقتضي تركيب السلسلة الجديدة cDNA ابتداءً من RNAm ذو ذيل متعدد الأدينيل (Poly A) .A

المحاضرة الأولى

تقنيات الكشف عن المجين

تقانة Southern blot (خاصة للـ DNA)

المراحل Southner blot

الغسيل و
التصوير
الإشعاعي
الذاتي
للمرشحات

التهجين
المسبق و
التهجين فوق
المرشحات

التهجين
الجزئي و
التوسيم
الإشعاعي
للحموض
النوية

نقل الحموض
النوية إلى
غشاء من
النتروسيللوز

الرحلان
الكهربائي
الهلامي
electrop
horesis

الأنزيمات
التي تستخدم
في معالجة
DNA

على الرغم من أن تقانة PCR قد حلت محل تقانة ساوزرن إلا أن هذه التقانة ما زالت ضرورية لكشف بعض التغيرات كبيرة الحجم في DNA و التي لا يمكن كشفها بتقانة PCR حيث طورت هذه التقانة في عام 1975 من قبل العالم Southern.

مبدأ التقانة: ينقى الحمض الريبي النووي منقوص الأوكسجين الصبغي و يقطع باستخدام إنزيمات التحديد restriction enzymes للحصول على قطع من الحمض الريبي النووي منقوص الأوكسجين مختلفة الأطوال.

المحاضرة الأولى تقنيات الكشف عن المجين

1960s | 1978

Discovery of restriction enzymes

Werner Arber Daniel Nathans Hamilton O. Smith

Restriction enzymes are named for the organism they come from:
EcoRI = 1st restriction enzyme found in *E. coli*

AP Biology

1. الأنزيمات التي تستخدم في معالجة الـ DNA

- هي:
- - أنزيمات التقييد, Restriction Enzyme أو الحصر و التقييد
- - أنزيمات البلمرة Polymerases E.
- - أنزيمات النيكليوز Nucleases E.
- - أنزيمات التعديل Modifying E.
- - أنزيمات الربط Ligases E.
- اكتشفت هذه الأنزيمات في السبعينيات، حيث قام بتوصيف تلك الأنزيمات العالمان Smith & Nathans وقد حازا على جائزة نوبل عام 1978 لاكتشافهم أنزيمات الاندونيوكلياز المقيدة أو المحددة. و يوجد حالياً أكثر من 500 نوعاً من هذه الأنزيمات متوفرة تجارياً.

المحاضرة الأولى

تقنيات الكشف عن المجين

إنزيمات التقييد (القطع) Restriction enzymes-cutting

- لا شك في أن لكل كائن حي طرق دفاعية مختلفة تحميه من الكائنات الأخرى مثلاً تقوم بعض أنواع من البكتيريا بإنتاج إنزيمات مهمتها تدمير الفيروسات التي تهاجمها، و من هذه الإنزيمات، الإنزيمات القاطعة التي تقوم بقص الحمض النووي (DNA) للفيروس و بذلك يُشل عمله و يُبطل مفعوله.
- و بما DNA مادة موجودة بشكل طبيعي في البكتيريا كما هو الحال في الفيروسات والكثير من الكائنات الحية فإن هذه الإنزيمات قد تشكل خطراً على البكتيريا نفسها في قصها للـ DNA الخاص بها.
- ولكن هذا لا يحدث و السر في ذلك هو قيام البكتيريا بتحويل أجزاء من DNA الخاص بها عن طريق إضافة مجموعة الميثيل إلى بعض الأسس الأزوتية من نوع الأدينين أو السيتوزين فلا يستطيع الأنزيم Methyl القاطع من قطع الحمض النووي الخاص بالبكتيريا.

المحاضرة الأولى

تقنيات الكشف عن المجين

Types Of Restriction Enzymes

- Type 1: enzymes recognize DNA sequences but cut the DNA in random sites that can be as far as 1,000 base pairs away from the recognized site.
- Type 2: enzymes recognize and cut within the recognized site.
- Type 3: enzymes recognize sequences but cut at a different location within 25 base pairs of the recognized site.

إنزيمات التقييد (القطع) Restriction enzymes-cutting

- تصنف إنزيمات القطع في ثلاثة أنواع وهي (I, II و III)
- و تكون معظم الإنزيمات المستخدمة من النوع الثاني II لأنها تقطع تسلسل نوعي من DNA و تتعرف عليه من خلال قطعه لرابطة الفوسفات ثنائية الاستر.
- أما النوعان I و III فهما لا يتعرفان على تسلسل معين للقطع و إنما يعملان على إزالة النيكليوتيدات في نهاية RNA و DNA.
- يختص كل إنزيم بمعرفة تتابع محدد من النيكليوتيدات في DNA و تكون معظم التتاليات أو التسلسلات المعروفة مكونة من أربعة أو خمسة أو ستة أزواج من القواعد طولاً و يمكن أن تصل إلى ثمانية أزواج من القواعد.
- و هذا التسلسل المعين يعرف باسم موقع القطع Restriction site أو موقع التعرف Recognition Site (Sequence).

المحاضرة الأولى

تقنيات الكشف عن المجين

أهم أنزيمات القطع المحددة وموقع عمل كل منها:

الإنزيم	المتابع المستهدف Target Sequence	الكائن الحي المنتج للإنزيم
EcoRI	TTC GAA AAG CTT	<i>Escherichia coli</i> RY13
BamHI	TCC GGA AGG CCT	<i>Bacillus amylolique faciens</i> H
BglII	TCT AGA AGA TCT	<i>Bacillus globigii</i>
Haell	GCpy PuGC CGpu pyCG	<i>Haemophilus aegyptius</i>
HindIII	CTT AAG GAA TTC	<i>Haemophilus influenza R</i>

تعتمد تسمية إنزيم القطع على الاسم اللاتيني للكائن الحي الذي يحوي الإنزيم، حيث يستخدم اسم الجنس للتعبير عن الجزء الأول من اسم الإنزيم و الحروف الأولى من اسم النوع ، كما يمكن أن يضاف إلى اسم الإنزيم بعض الحروف أو الأرقام التي تعبر عن اسم السلالة ورقمها

إنزيمات التقييد (القطع) Restriction enzymes-cutting

- على افتراض أن هذه الأسس موزعة عشوائياً فإنه يمكن حساب تواتر أي متابع خاص 4^n حيث n هي طولاً للمتابع المحدد للإنزيم
- على هذا الأساس يمكن التنبؤ بالعثور على جزيء رباعي النيكليوتيد ضمن 256 زوجاً قاعدياً، و خماسي النيكليوتيد ضمن 1024 زوج قاعدي و سداسي النيكليوتيد ضمن 4096 زوجاً قاعدياً.
- و عليه فالإنزيم المحدد لمتابع رباعي النيكليوتيد سينتج القطع الأقصر من الحمض الريبي النووي منقوص الأوكسجين بالمقارنة مع الإنزيم المحدد لمتابع سداسي النيكليوتيد.

المحاضرة الأولى

تقنيات الكشف عن المجين

خصائص إنزيمات التقييد (القطع) Restriction enzymes- cutting

1. غالباً ما يتم عزلها من أنواع البكتيريا المختلفة أو فطر الخميرة.
2. تقطع الحمض النووي في نقطة محددة أو مكان وموقع قطع معين

Recognition Site

3. تعمل كنظام مناعي مصغر للبكتيريا يحميها من جزئيات الحمض الريبي النووي منقوص الأوكسجين الغريبة مثل الإصابة الفيروسية.

4. أنزيمات القطع إما أن تترك نهايات لاصقة أو بشكل متعرج cohesive or

sticky في 5' و 3' مثل الإنزيم القاطع (EcoR1) الذي يقطع عندما يجد 6

من الأحماض النووية في هذا التسلسل (GAATTC) أو نهايات تامة أو حادة

أو بشكل رأسي مستقيم blunt مثل الإنزيم القاطع (Hpa1) الذي يقطع

عندما يجد 6 من الأحماض النووية في هذا التسلسل (GTTAAC) يوجد

في بكتيريا الهيموفلس بارا انفلونزا (*Hemophilus parainfluenzae*)

CUT BY *Hpa1*

BLUNT ENDS

CUT BY *EcoR1*

STICKY ENDS

تكون مناطق القطع غالباً متقابلة (ذات تسلسل متعاكس) palindromic sequences

المحاضرة الأولى

تقنيات الكشف عن المجين

2. الرحلان الكهربائي الهلامي Gel electrophoresis

- تعد تقنية الرحلان الكهربائي من المقومات الأساسية للهندسة الوراثية, و التي بواسطتها يتم تصور قطع الحمض النووي مباشرة
- تعتمد هذه الطريقة على طبيعة الحموض النووية التي تمثل مركبات متعددة الشحنة السالبة Polyanionic في درجة pH متعادلة, تحمل الأحماض النووية شحنات سالبة متعددة من خلال المجموعات الفوسفاتية ثنائية الاستر لسلاسل الحمض النووي.
- و يعني ذلك هجرة الجزيئات نحو القطب الموجب عند وضعها في مجال كهربائي.

- يوجد نوعان من الهلامات gel تستعملان بشكل واسع و هما: الأغاروز Agarose و متعدد الأكريلاميد Polyacrylamide.

تمر الجزيئات عبر حقل كهربائي متنوع الجهد و تهجر إلى الألكترود المناسب, و تعتمد سرعة الهجرة على: الجهد المختلف بين القطبين, شحنة الحموض النووية, المسافة بين الألكترودين, و لزوجة المحاليل (تركيز الهلامة و حجم الثقوب). فبذلك تهجر القطع الصغيرة (ذات الوزن الجزيئي المنخفض) بسرعة أكبر من هجرة القطع الكبيرة (ذات الوزن الجزيئي المرتفع).

المحاضرة الأولى

تقنيات الكشف عن المجين

2. الرحلان الكهربائي الهلامي Gel electrophoresis

- هلامة الأغاروز
- جزيء الأغاروز عبارة عن متعدد السكاريد الخطي مركب من تكرار وحدة Agarobiose الذي بدوره يتكون من تسلسل للسكر البسيط الغالاكتوز و مستخلص من الطحلب البحري Seaweed
- كما يتميز الأغاروز أيضاً بأنه مادة هشة ضعيفة و تتكسر بسهولة بالتسخين (طورت في عام 1970)
- يتراوح تركيز هلامة الأغاروز بين 0,7% و 2%.
- تكون المسامات في الهلامة كبيرة في حال التركيز 0,7% و تستخدم لفصل القطع الكبيرة من DNA (5-10 Kb)
- في حين تكون المسامات صغيرة في حال التركيز 2% و تستخدم لفصل القطع الصغيرة من DNA (0.2-1 Kb)
- تستخدم هلامة الأغاروز لإظهار DNA الناتجة عن استخدام أنزيمات القطع, تحديد نقاوة DNA ، فصل قطع DNA أو RNA و تحديد أطوالها.

المحاضرة الأولى

تقنيات الكشف عن المجين

2. الرحلان الكهربائي الهلامي Gel electrophoresis

هلامة الأكريلاميد

- وصفت هلامة متعدد الأكريلاميد من قبل Raymond and Weintuab عام 1959
- تستخدم هذه الهلامة في فصل جزيئات صغيرة من DNA و يكون ذلك مهماً في عزل القطع التي تختلف في الطول بأساس أزوتي واحد فقط، و ذلك لان حجم مساماتها أصغر و هي أكثر مرونة و تحدد بوضوح الحزم مقارنة بهلامة الأغاروز.
- يتراوح تركيز هلامة متعدد الأكريلاميد بين 3-30%
- و هي تسمح بفصل جزيئات البروتين التي تتراوح أوزانها الجزيئية من 5 إلى 2000 KDa
- و تكون الهلامة رقيقة جداً (5 مم أو أقل)
- كما يمكن حفظ هذه الهلامة في الكحول مدة طويلة.
- كما تستخدم هلامة متعدد الأكريلاميد لفصل جزيئات البروتين و متعدد الببتيد و لتحديد تتابع DNA

المحاضرة الأولى

تقنيات الكشف عن المجين

2. الرحلان الكهربائي الهلامي Gel electrophoresis

◦ يستمر الرحلان الكهربائي حتى وصول الصبغة المرئية المستخدمة (صبغة بروموفينول الزرقاء ذات الوزن الجزيئي 300 bp) إلى نهاية الهلامة (دليل نهاية الرحلان الكهربائي).

◦ كما يمكن في بعض الأحيان استخدام صبغة Xylene cyanol ذات الوزن الجزيئي 5000bp

◦ يمكن رؤية الحمض النووي المتوضع على الهلامة بإضافة صبغة الأثيديوم برومايد، التي تتخلل بين الأسس الأزوتية للـ DNA و تتفاعل معها DNA عندئذ ذو وميض وهاج فيسهل تعينها وتصويرها بالأشعة فوق البنفسجية UV

◦ و لا بد من إضافة مؤشر يعبر عن الطول الجزيئي (Marker ladder) و هو عبارة عن محلول تجاري يتألف من قطع DNA ذات أطوال معروفة و يستخدم هذا المؤشر للمقارنة

المحاضرة الأولى

تقنيات الكشف عن المجين

3. نقل الحموض النووية إلى غشاء من النتروسيللوز

◦ تستخدم هذه الطريقة عند الحاجة إلى توسيم الأحماض النووية بمسابر العناصر المشعة لتحديد طول المورثة وعدد نسخها على المجين.

◦ من أجل نقل و تثبيت DNA من الهلامة إلى غشاء من النتروسيللوز:

1. تتم معاملة الهلامة على درجة حرارة الغرفة بالمحاليل المخففة مثل (HCl) للحصول على قطع كبيرة من DNA لتسهيل عملية النقل)

2. و من ثم توضع في محاليل تحتوي على NaOH و NaCl لفصل سلاسل DNA و تحويل هذه القطع من سلسلة مضاعفة double strands إلى سلسلة مفردة Single strands

3. تنتقل الهلامة إلى وعاء يحتوي على محلول النقل و يوضع غشاء النتروسيللوز فوق الهلامة مدة 12 ساعة و ينتقل بالتالي DNA إلى الغشاء عن طريق الخاصية الشعرية.

4. يتم DNA بوضعه مدة ساعتين على درجة حرارة 80°م.

المحاضرة الأولى

تقنيات الكشف عن المجين

4. التهجين الجزيئي و التوسيم الإشعاعي للحموض النووية

◦ تكمن أهم مشكلة تواجه أي برنامج لعمليات التنسيل، في الحفاظ على إمكانية تعقب الكمية القليلة من الحمض النووي المستخدم لأن فقدان أي جزء من هذه المادة يعني التناقص في العمل بعد كل خطوة.

◦ توجد طريقة لتعقب المادة النووية و تتضمن توسيمها (Hybridization) بواسطة جزيء نشط إشعاعياً (عادةً يستخدم النيكليوزيد ثلاثي الفوسفات dNTP) بتوسيم أحد العناصر، H³ أو P³² الموجودة في بنية النيكليوزيد حيث تستخدم تلك العناصر لأنها ذات طاقة عالية.

◦ و بذلك يمكن قياس النشاط الإشعاعي بواسطة مقياس إشعاعي لغرض تحديد كمية الحمض النووي ذو النشاط الإشعاعي العالي ضمن تجارب التهجين و يعرف هذا الجزيء بالمسبار النشط

إشعاعياً Radioactive probe

◦ من بعض الطرق المعروفة في توسيم الحموض النووية: التوسيم الطرفي، الترجمة المتممة

Primer extension. و Nick translation و التوسيم عن طريق استطالة البادئ

المحاضرة الأولى

تقنيات الكشف عن المجين

5. التهجين المسبق و التهجين فوق المرشحات

- يتوضع محلول التهجين المسبق في المواقع الحرة على غشاء النتروسيللوز و هذا يمنع التثبيت اللانوعي للمسبار (Blocking) .
- و من ثم تفصل سلاسل DNA المزدوجة للمسبار المعلم إشعاعياً عن طريق التسخين بدرجة حرارة 100°م و تضاف إلى الغشاء.
- يجرى التهجين بدرجة حرارة تتراوح بين 65°م و 85°م لعدة ساعات لفسح المجال في تشكيل الأزواج الملائم
- و يمكن تقدير درجة التهجين باستخدام مقياس طيف وميضي Scintillation spectrometer
- يوضع الغشاء في قارورة زجاجية في فرن التهجين مدة 16 ساعة تحت تأثير الرج الخفيف.

6. الغسيل و التصوير الإشعاعي الذاتي للمرشحات

- يتم الغسيل من أجل نزع المسبار غير المهجن و إزالة التهجين اللانوعي
- ثم توضع المرشحات النتروسيللوزية في حقيبة بلاستيكية و توضع في علبة بتماس مع فيلم أشعة X لإنتاج الصورة الذاتية autoradiogram.
- تسمى العملية بالتصوير الإشعاعي الذاتي حيث تظهر عصابات فاتحة اللون على خلفية غامقة في مواضع تتفق مع أوزانها الجزيئية و يمكن مقارنة أطوال هذه الحزم مع أجزاء DNA قياسية توضع كمعلومات في بئر ثاني.
- و يستفاد من تقانة southern blot لتحديد أطوال المورثات و قطع الحمض الريبي النووي منقوص الأوكسجين و عدد نسخ هذه المورثة في المجين.

المحاضرة الأولى

تقنيات الكشف عن المجين

تقانة Northern blot (خاصة للـ RNA)

- يفصل **RNA** بالرحلان الكهربائي على هلامة الأغاروز إلى قطع مختلفة الحجم
- تنقل قطع **RNA** مفردة السلسلة بعد ذلك من الأغاروز إلى غشاء ذو نوعية خاصة Membrane و تدعى هذه العملية بتتبع Northern
- يهجن RNA مع مسابر من الحمض الريبي النووي منقوص الأوكسجين الموسومة بالفوسفور المشع p32.
- و يستفاد من تقانة Northern blot في تحديد أماكن نسخ المورثة و التعبير المورثي

المحاضرة الأولى تقنيات الكشف عن المجين

تقانة Western blot (خاصة البروتينات)

تعمد هذه الطريقة على استخدام الطريقة المناعية لفحص الناتج البروتيني للمورثة المنسلة في عينة أو مستخلص ما كبديل عن طريقة الفحص بمسابر الحموض النووية.

يتم الفصل على هلامة متعدد الأكريلاميد ولها نوعان:

1. Sodium Dodecyl Sulfate - PolyAcrylamide Gel Electrophoresis SDS-PAGE

2. PAGE ثنائي الأبعاد Discontinuous electrophoresis: إنها تقنية مستخدمة على نطاق واسع

لفصل البروتينات حسب الحجم والشحنة

تحتفظ مادة SDS على سلسلة البروتينات في حالة مفككة (denatured state) مثل تحويل الروابط ثنائية الكبريت S-S إلى SH و SH و بذلك يسمح لفصل البروتينات حسب وزنهم الجزيئي.

كما تقوم هذه المادة بشحن البروتينات بالشحنة السالبة ونقلها إلى القطب الكهربائي الموجب

Discontinuous gel electrophoresis

المحاضرة الأولى

تقنيات الكشف عن المجين

تقانة Western blot (خاصة البروتينات)

يمكن رؤية البروتينات المتوضعة على الهلام بإضافة صبغة أزرق الكوماسي فتظهر البروتينات بشكل حزم ملونة باللون الأزرق (Coomassie Blue)، كما يمكن استخدام التلوين بنترات الفضة عندما يكون التلوين بأزرق الكوماسي غير فعال.

و لا بد من إضافة مؤشر يعبر عن الطول الجزيئي KDa .

ثم يتم نقل البروتينات باستخدام تيار كهربائي لسحب البروتينات (electrophoresis) من الهلام إلى غشاء

مصنوع من النيتروسيليلوز بالخاصية الشعرية Capillary action

إن التصاق البروتينات على الغشاء بسبب تفاعلات كارهة للماء hydrophobic interactions، بالإضافة إلى

التفاعلات المشحونة بين الغشاء والبروتين

يمكن التأكد من نقل البروتين إلى الغشاء بصبغ الغشاء بصبغة أحمر البونسو Ponceau S

Diagram 1: Illustration of Western Blot Setup.

المحاضرة الأولى

تقنيات الكشف عن المجين

تقانة Western blot (خاصة البروتينات)

- يتم التحقق من وجود البروتين المطلوب على الغشاء عن طريق إضافة جسم مضاد معدل مرتبط بإنزيم ما و يكون هذا جزءاً من الإستجابة المناعية.
- بعد حضن الغشاء في محلول مخفف من البروتين - عادة ما يكون هذا البروتين هو ألبومين مصل البقر Bovine Serum Albumin المعروف برمز BSA أو حليب مسحوب الدسم مع مقدار صغير من منظف مثل توين Tween 20 و من الجسم المضاد الأولي (عادة بتركيز بين 0,5 ميكروغرام/مل إلى 5 ميكروغرام/مل) مع التحريك الخفيف.
- بعد ذلك لا بد من غسل الغشاء لإزالة الأجسام المضادة الأولية غير ملتصقة، يتم إضافة جسم مضاد آخر للغشاء، موجه نحو جزء الجسم المضاد الأولي، وهذا يعرف بالجسم المضاد الثانوي، و بسبب خواصه المستهدفة و عادة ما يكون الجسم المضاد الثانوي مرتبط بجزئية بيوتين أو إلى إنزيم مثل فسفاتاز قلوي alkaline phosphatase أو بيروكسيداز.
- ثم سنتلصق أن عدة أجسام مضادة ثانوية بجسم مضاد أولي واحد وتقوم بتعزيز الكشف عن البروتين.
- و يتم الكشف عن وجود البروتين و غيابه بإحدى الطرائق التالية: الكشف اللوني Colorimetric detection و الإضاءة الكيميائية Chemiluminescence و الكشف المشع Radioactive detection و الكشف الفلوري . Fluorescent detection
- يستفاد من تقانة Western blot في تحديد الوزن الجزيئي للبروتين و تمركز البروتين في المتعضيات

المحاضرة الأولى

تقنيات الكشف عن المجين

استخلاص و تنقية قطعة الحمض الريبي DNA من هلامة الأغاروز

- تحتاج معظم أبحاث الهندسة الوراثية إلى استخلاص تسلسل محدد من DNA ، و بالأخص تلك التي تهدف إلى المعرفة الدقيقة لتركييب مورثة ما، أو جزء منها ضمن الذخيرة الوراثية للكائن الحي، أو لعمليات التنسيل الجيني المختلفة
- و لهذا الغرض يتم استخلاص الحمض DNA المعني من خلايا الكائنات الحية المختلفة ومن ثم يقطع بأنزيمات القطع.
- يلي ذلك إجراء الرحلان الكهربائي على هلامة الأغاروز لكمية محددة من DNA حتى يتسنى معرفة حجم القطع و من ثم تعيين المطلوب منها بالمقارنة مع الحمض الريبي النووي منقوص الأوكسجين الشاهد (يحدد طوله بالكيلو باز Kbp).
- يتم بعد تحديد القطع قطع هلامة الأغاروز بشرط حاد بحيث تكون قطعة DNA بداخلها ليتم وزنها بدقة (يفضل أن لا يزيد وزن هلامة الأغاروز المحتوية على DNA عن 300mg حتى يتم إذابتها في المحلول المعد لهذا الغرض)
- و بعد ذلك يتم ترسيب DNA .

مقرر التقانات الحيوية
(الجزء النظري)
السنة الثانية، قسم المحاصيل الحقلية

د. نور علي

مدرس في قسم المحاصيل الحقلية

المحاضرة الثانية

التتسيل أو الاستنساخ Cloning

Dolly: The Cloning of a Sheep, 1996

○ الاستنساخ هو عملية إنتاج أفراد بحمض نووي مطابق أو متطابق تقريبًا ، إما بشكل طبيعي أو اصطناعي.

○ في الطبيعة ، تنتج العديد من الكائنات المستنسخة من خلال التكاثر اللاجنسي.

○ يشير الاستنساخ في التكنولوجيا الحيوية إلى عملية إنشاء نسخ من كائنات حية أو نسخ من الخلايا أو أجزاء من الحمض النووي (الاستنساخ الجزيئي).

المحاضرة الثانية

التنسيل أو الاستنساخ Cloning

◦ على الرغم من أن DNA يمثل كامل الذخيرة الوراثية للكائن الحي فإنه من الممكن أن يحتوي على الانترونات (قطع DNA غير المشفر)، مناطق السيطرة (Control Regions)، و تتابعات التكرار (Repetitive Sequences).

◦ إن وجود تلك القطع أو المناطق يمكن أن تؤدي إلى حدوث بعض الصعوبات في عملية التنسيل، و بشكل خاص إذا كانت الذخيرة الوراثية كبيرة و كان الهدف هو عزل نسخة مفردة من المورثة.

المحاضرة الثانية

التنسيل أو الاستنساخ Cloning

التنسيل من mRNA بناء cDNA:

©Addison Wesley Longman, Inc.

- لا يمكن تنسيل RNAm مباشرة لذا يجب تحويله إلى DNA قبل البدء في عملية التنسيل.
- يحوي mRNA النقي دائماً على ذيل مؤلف من متعددات A بالنهاية '3 ، و يهجن هذا الطرف مع قطع من DNA الصناعية تحوي متعددات T التي تعمل كبادئ لاصطناع سلسلة DNA .
- و من ثم يخلط mRNA مع dNTPs بالإضافة لأنزيم النسخ العكسي الذي يحفز اصطناع سلسلة DNA المكملة لسلسلة mRNA .
- يمكن إزالة mRNA بواسطة الاماهة القلوية
- فيما بعد يتم تحويل cDNA المفرد السلسلة إلى سلسلة مزدوجة و ذلك باستخدام أنزيم DNA-polymerase
- يتم توليد البادىء (3' - OH) ضمن بناء السلسلة الثانية و ذلك عن طريق مناطق قصيرة تشبه رأس الدبوس و التي تتشكل في نهاية DNA مضاعف السلسلة.
- يشذب cDNA مضاعف السلسلة بعد بناء السلسلة الثانية بواسطة أنزيم (S1 nuclease) ليعطي جزيئة ذات نهاية مسطحة نشطة يمكن فيما بعد تنسيقها ضمن ناقل ملائم.

المحاضرة الثانية

التنسيل أو الاستنساخ Cloning

خطوات التنسيل

خطوات التنسيل

◦ تدخل القطعة المراد نسخها (المورثة) في إحدى النواقل الوراثية (البكتريوفاج، خمائر، بلاسميد أو غيرها) المعروفة بقدرتها على التضاعف الذاتي.

◦ بغض النظر عن نوع الناقل الوراثي المستخدم فإن طريقة إدخال قطعة DNA المراد نسخها إلى الناقل تقريباً واحدة و لا يختلف تنسيل cDNA بنواقل بكتيرية أو فاجية كقاعدة عامة، عن تنسيل أي قطعة أخرى من DNA .

◦ علماً بأنه لا توجد طريقة تنسيل واحدة تستطيع تغطية جميع الاحتياجات.

المحاضرة الثانية

التسليخ أو الاستنساخ Cloning

1. تصميم القطع المهجنة من DNA

يضاف إلى قطعة DNA إنزيم قطع محدد و ليكن مثلاً إنزيم (أ) فيقوم هذا الإنزيم بقطع DNA في مكان محدد حسب التسلسل الخاص به و يضاف الإنزيم نفسه للناقل و الذي يقوم بقطعه أيضاً في نفس التسلسل

من ثم تضاف القطع المراد نسخها (DNA) بعد قطعها بالإنزيم القاطع إلى الناقل المقطع فتتداخل التسلسلات النووية بين الناقل و بين قطع DNA المراد نسخها.

و ينتج قطعة مهجنة من الناقل و بداخله القطعة المراد نسخها (مورثة).

يضاف إنزيم الوصل أو الربط (Ligase) لربط قطعة DNA مع البلاسميد

المحاضرة الثانية

التيسيل أو الاستنساخ Cloning

النواقل و انواعها

- النواقل هي في الغالب فيروسات أو بلاسميدات كما أن هناك أنواع مصنعة تستخدم في المختبرات الطبية.
- إن أكثر النواقل استخداماً هي البلاسميد و لكن يمكن استخدام الفاج أو الياك أو أي ناقل آخر و الذي يحدد نوع الناقل المراد استخدامه هو في العادة كبر القطعة المراد استنساخها.
- ففي حالة القطع الصغيرة يستخدم البلاسميد أو الفاج بينما يستخدم YAC أو BAC في حالة القطع الكبيرة من DNA

المحاضرة الثانية

التسليـل أو الاستنساخ Cloning

النواقل البلاسميدية المستخدمة في بكتريا *E. coli*

- البلاسميدات هي عبارة عن جزيئات DNA شبيهة بالفيروسات الصغيرة و لكنها لا تحتوي على غلاف من البروتين.
- تتكون البلاسميدات من جزيئات من DNA، مضاعفة السلسلة، حلقية، و تكون نسبياً صغيرة بالمقارنة مع صبغي الخلية و غالباً موجودة في حالة صبغي إضافي .Extrachomosomal.
- تتميز البلاسميدات بقدرتها على التضاعف الذاتي و بمعزل عن بقية الصبغيات الموجودة في الخلية و ذلك لاحتوائها على وحدة التضاعف الذاتي (وهي تسلسل نوعي من DNA مؤلف من 50-100 pb و موجودة ضمن البلاسميد).

المحاضرة الثانية

التنسيل أو الاستنساخ Cloning

النواقل البلاسميدية المستخدمة في بكتريا *E. coli*

◦ بالإضافة إلى ذلك فهناك كثير من المورثات التي قد تكون على البلاسميد و هي مفيدة للعلماء في عملية نسخ المورثات، فمثلاً يوجد على البلاسميد مورثة خاصة تكافح المضادات الحيوية Antibiotics كالأمبيسيلين و التتراسيكلين و البنسلين و الكاناميسين و الكلوروموفينيكول).

◦ تساعد هذه المورثات الحامية من المضادات الحيوية في التعرف على البكتيريا التي تحتوي على البلاسميد الذي يحمل المورثة الذي نود استنساخها و عزلها.

◦ كما تمتلك البلاسميدات أيضاً منطقة التنسيل المتعددة (أماكن وجود إنزيمات القطع) و يتم في هذه المنطقة إدخال DNA الغريب

◦ يوجد بلاسميدات تستطيع التكاثر داخل البكتيريا و الخميرة في آن واحد.

المحاضرة الثانية التنسيل أو الاستنساخ Cloning

النواقل البلاسميدية المستخدمة في بكتريا E. coli

◦ و من البلاسميدات شائعة الاستخدام:

1. البلاسميد pBR322 و pAT153 (يمتلك سمات الناقل الجيد، مثل الوزن الجزيئي المنخفض، و مورثات مقاومة للمضادات الحيوية مثل الأمبيسيلين و التتراسيكلين Apr, Tcr, بالإضافة إلى عدة مواقع أحادية القطع)

2. سلسلة بلاسميدات العائلة البلاسميدية pUC (حيث تمتلك هذه البلاسميدات منطقة تحتوي على عدة مواقع قطع مفردة لإنزيم الأندونيوكلياز ضمن امتداد قصير للـ DNA و التي تكون مفيدة بسبب إمكانية الاختيار للموقع القابل لإدخال قطع DNA)

◦ على الرغم من امتلاك النواقل البلاسميدية بالعديد من الخواص المفيدة، فهي تمتلك أيضاً عدد من السلبيات، و أحد أهم هذه السلبيات هو حجم قطعة DNA التي يمكن إدخالها إلى البلاسميدات، و التي تكون بأقصى مدى 5 kb من DNA على الأكثر و التي تؤثر بشدة على فعالية التنسيل.

◦ في بعض التطبيقات فإنه من المهم زيادة حجم القطع التي يمكن تنسيقها و يحتاج مثل هذا النوع من العمل لنواقل لها القابلية لاستقبال قطع

أكبر من DNA و منها الفاج البكتيري لميدا Bacteriophage lambda

المحاضرة الثانية

التنسيل أو الاستنساخ Cloning

M13 Phage

الفاجات البكتيرية

○ هي ببساطة فيروسات آكلات البكتيريا و تعتمد في توالدها (تضاعفها) على البكتيريا.

○ تصنف الفاجات تركيبياً ضمن ثلاث مجموعات رئيسية:

- عديمة الذنب: (غير مذنب) Tailless.

- المذنب (Head and tail): بحيث يوجد الرأس (الحاوي على DNA الفيروسي) مع الذنب

(يستخدم لإصابة الخلايا المضيفة *E. coli*).

- خيطية Filamentous

○ بالرغم من أن النواقل التي بنيت على أساس الفاجات البكتيرية هي أكثر تخصصاً من النواقل

البلاسميدية, إلا أنها متشابهة معها في الوظيفة من الناحية الجوهرية, أي أنها تعمل كحاملة لقطع

جزيئات DNA و قد طور بشكل واسع نوعان من الفاجات البكتيرية (M13-λ) (لمبيدا فاج أو

Lambda phage) لأغراض التنسيل.

المحاضرة الثانية

التنسيل أو الاستنساخ Cloning

الفاجات البكتيرية

◦ تعد الفاجات أفضل من البلاسميدات للأسباب الآتية:

1. تستطيع الفاجات إصابة الخلايا بفعالية أكبر من البلاسميدات.
2. معدل ظهور المستعمرات عادةً يكون أعلى.
3. تعود فعالية الفاج δ لأنها تستخدم في بناء المكتبات الوراثية.

لقد حوّرت هذه النواقل لكي تستطيع حمل أكبر كمية من DNA فعلى سبيل المثال

الكوسميد Cosmids عبارة عن تهجين جزء من فاج ليمبدا مع البلاسميد و بذلك تكون

ملائمة لتنسيل قطع DNA لما يقرب 47 كيلوباز (kb) في الطول

ori: منطقة التضاعف الذاتي.

amp^r: مورثة تكافح المضاد الحيوي.

COS: مورثة β _galactosidase و التي ترمز لنفس

الإنزيم بيتا غالاكتوزيداز.

MCS: منطقة إنزيمات القطع.

المحاضرة الثانية التنسيل أو الاستنساخ Cloning

النواقل الصبغية الصناعية Artificial Chromosomes

1. صبغية الخميرة الصناعي (Yeast Artificial Chromosomes/YAC)

- يستطيع هذا الناقل نقل قطعة كبيرة من DNA أكبر من 500 كيلوباز (kb 500) و هو عبارة عن قطعة من DNA مترابطة و تحتوي على:
 - طرفي الصبغي (Telomeres 2)
 - و الجزيء المركزي للصبغي (Centromere)
 - و مركز للتضاعف الذاتي (Autonomous replicating sequence ARS).
 - و يمكن استخدامه من أجل تنسيل قطع كبيرة جداً من DNA و لإنتاج مكتبة وراثية لكائن حي ما.

المحاضرة الثانية

التسليق أو الاستنساخ Cloning

النواقل الصبغية الصناعية Artificial Chromosomes

2. صبغى البكتريا الصناعي

BAC (Bacterial Artificial Chromosomes)

◦ يستطيع هذا الناقل حمل حتى 150 كيلوباز

◦ (هو عبارة عن تحويل للبلاسميد المعروف بعامل تكاثر بكتيريا *E. coli*

(Fertility plasmid-factor)

المحاضرة الثانية

التنسيل أو الاستنساخ Cloning

2. نقل القطعة المهجنة المحمولة داخل الناقل إلى خلية حية

1. خلايا بدائيات النوى المضيفة Prokaryotic hosts

- خلايا سهلة الاستخدام و لها القابلية العالية على التكاثر وتتضمن سلالات متنوعة و معروفة وراثياً و كذلك مدى إمكانيتها في استقبال النواقل.
- تستخدم الخلايا البكتيرية و خاصة خلايا *E. coli* و هي خلايا غير مميزة النواة Prokaryotic Cells سالبة غرام، و مفردة الصبغي (الكروموسوم)، حجم ذخيرتها الوراثية $(10^6 \times 4)$ bp.
- تعيش هذه البكتيريا في أمعاء الإنسان و الثدييات (القولون).

- يتميز سيتوبلازما البكتيريا بوجود صبغي حلقي وحيد (يمثل DNA الرئيسي للبكتيريا) و جزيئات من DNA حلقي صغيرة الحجم تدعى البلاسميدات عنصر وراثي مستقل Plasmides (كل بلاسميد يضم حوالي 100 مورثة)
- من المعوقات الرئيسية لاستخدام *E. coli* في عملية التنسيل كونها من بدائيات النوى التي ينقصها الغشاء النووي و يعني ذلك أن مورثات محددة لحقيقيات النوى قد لا يمكنها أداء وظيفتها في خلايا *E. coli*. فقد لا يكون من السهل التأكد بأن الخلية بدائية النوى تستطيع إنتاج البروتين الكامل الوظيفة.

المحاضرة الثانية

التنسيل أو الاستنساخ Cloning

2. نقل القطعة المهجنة المحمولة داخل الناقل إلى خلية حية

أنواع الخلايا المضيفة

2. خلايا حقيقية النوى المضيفة Eukaryotic cell hosts

- تعد خمائر *Saccharomyces cerevisiae* من أفضل الكائنات حقيقية النوى المجهرية استخداماً في الهندسة الوراثية.
- لقد استخدمت هذه الكائنات الحية لقرون عديدة في إنتاج الخبز و صناعة البيرة
- تحتوي ذخيرتها الوراثية على $(10^7 \times 1.35)$ زوجاً من أزواج قواعد DNA و لذلك تزيد بما يقرب من ثلاثة أضعاف و نصف عن الذخيرة الوراثية لبكتيريا *E. coli*
- كما تستخدم فطريات أخرى في عمليات التنسيل مثل *Aspergillus nidulans* و *Neurospora crassa*

المحاضرة الثانية

التسلييل أو الاستنساخ Cloning

3. اختيار المستعمرات البكتيرية التي تحتوي على الناقل و القطعة المهجنة

- ينتج لدينا مع تكاثر الخلايا البكتيرية و تكاثر البلاسميد بداخلها أعداداً كثيرةً من المستعمرات البكتيرية و بها البلاسميد المهجن.
- و لكن قد يكون في داخل الطبق الذي زرعت فيه البكتيريا، بعض البكتيريا التي لا تحتوي على البلاسميد المهجن
- و يمكن التعرف عليها عن طريق استعمال نواقل تحمل مورثات مقاومة للمضادات الحيوية، كالمورثة المقاومة للمضاد الحيوي الامبيسيلين أو التتراسيكلين و غيرها، فيضاف المضاد الحيوي إلى وسط النمو وهو سوف يمنع تكاثر أي خلية بكتيرية أخرى

المحاضرة الثانية

التسلييل أو الاستنساخ Cloning

4. استخلاص القطع المهجنة و الاستخراج الكمي للـ DNA

- بعد أن نميز المستعمرات التي تحتوي على البلاسميد المهجن فإنه يمكن نقلها إلى طبق جديد للمحافظة عليها و التكاثر.
- و يستفاد من قطع DNA المنسوخة في القيام بالمزيد من البحوث أو التجارب عليها (مثلاً إنتاج مكتبة DNA أو محاولة استنتاج التسلسل النووي للقطعة).
- و يمكن الكشف عن البكتريا التي تحمل قطع DNA المهجن و ذلك بوضع IPTG (ISO-propylthiogalactoside) (مصدر لنسخ المورثة LacZ) و X gal (5-bromo-4-chloro-3-indolyl-β-D-galactopyranoside) في وسط النمو.
- حيث تعمل هذه المواد على تلون البكتريا بلون أزرق و هو دليل على أن هذا DNA المهجن لم يدخل ضمن البكتريا, أما إذا تلونت البكتريا بلون أبيض فهو دليل على دخول DNA المهجن إليها

مقرر التقانات الحيوية
(الجزء النظري)
السنة الرابعة، قسم المحاصيل الحقلية

د. نور علي

مدرس في قسم المحاصيل الحقلية

المحاضرة الثالثة

التوسيم الإشعاعي و قراءة التتابعات

- تكمّن أهم مشكلة تواجه أي برنامج لعمليات التنسيل في الحفاظ على إمكانية تعقب الكمية القليلة من الحمض النووي المستخدم لان فقدان أي جزء من هذه المادة يعني التناقض في العمل بعد كل خطوة.
- توجد طريقة لتعقب المادة النووية تتضمن توسيمها بواسطة جزيء تشط إشعاعاً (عادة dNTP) عن طريق H^3 أو P^{32} (ذو الطاقة العالية) أو C^{14} .
- يمكن ان تضاف العناصر المشعة في المواقع (γ, β, α)
 - التوسيم الطرفي
 - الترجمة المتممة Nick translation
 - التوسيم عن طريق استطالة البادئ Primer extension

المحاضرة الثالثة

أولاً: التوسيم الإشعاعي

التوسيم الطرفي End labeling

○ يستخدم في هذه التقنية إنزيم Polynucleotide kinase من أجل نقل مجموعة فوسفاتية نهائية في ATP إلى النهاية 5' لجزيء النووي.

○ فإذا كان الـ ATP المانح موسوم بعنصر مشع بالتالي ينتج حمض نووي موسوم نسبياً بالنشاط الإشعاعي أي أن النهاية لكل جزيء ستكون فقط نشطة إشعاعياً

المحاضرة الثالثة

أولاً: التوسيم الإشعاعي

الترجمة المتممة Nick translation

- يمكن التحقق في هذه الطريقة بالاعتماد على قابلية الإنزيم DNA polymerase I تشكيل رابطة فوسفاتية ثنائية الاستر في الحلزون المضاعف للـ DNA .
- يمكن أن يحدث هذا المتمم طبيعياً بوجود تركيز منخفض من إنزيم النيكليوز DNase في مزيج التفاعل.
- يتوسط إنزيم DNA polymerase I تفاعل تبديل السلسلة و الذي يدمج dNTPs في سلسلة الـ DNA فإذا كان واحد من النيكليوتيدات الأربعة المندمجة تملك نشاطاً إشعاعياً فالنتيجة هي الحصول على جزيء DNA عالي التوسيم

المحاضرة الثالثة

أولاً: التوسيم الإشعاعي

Random primed labeling

التوسيم عن طريق استطالة البادئ Primer extension

○ يستخدم في هذه الطريقة اوليغونيكليوتيد (متعدد نيكليوتيد) أو البادئات مكون من ستة نيكليوتيدات منقوصة الأكسجين لبدء بناء سلسلة الحمض النووي الـ DNA بواسطة إنزيم الـ DNA polymerase.

1. يتم أولاً تحويل سلسلة الـ DNA المضاعفة إلى سلسلة مفردة بالتسخين

2. يتم إضافة لبادئات إلى وسط التفاعل لتندمج و تلتصق بالسلسلة المفردة

3. ثم تضاف قطعة كلينو Klenow fragment المستخلصة من E.coli، حيث يتم البدء ببناء نسخة من القالب بادئة من مجموعة الهيدروكسيل على النهاية 3' للتتابع السابق

4. يتم إضافة الـ dNTPs الموسومة و بالتالي يتم إنتاج جزيء DNA عالي النشاط الإشعاعي

المحاضرة الثالثة

ثانياً: قراءة التتابعات

تحتل القدرة على تحديد تتابع النيكليوتيدات للحمض النووي الـ DNA مكاناً مركزياً في علم الأحياء الجزيئي وذلك لأنها تسمح في معرفة ما هو جوهري في تركيب المعلومات الوراثية.

و لقد طورت الطرق السريعة لتحليل التتابع في نهاية السبعينيات، بحيث أصبحت هذه التقنية مستخدمة في المختبرات و على نطاق واسع.

توجد طريقتان أساسيتان في تحديد تتابع النيوكليوتيدات في الحمض النووي الـ DNA، وهما:

1. الطريقة الكيميائية التي كورت من قبل العالمان آلن مكسام و ولتر جلبرت

2. الطريقة الإنزيمية التي طورت من قبل العالمان فريد سنجر و آلن كولسون.

لقد حلت الطريقة الإنزيمية محل الكيميائية بشكل واسع و مرغوب.

المحاضرة الثالثة

ثانياً: قراءة التتابعات

أولاً: طريقة مكسام – جلبرت الكيميائية (Maxam-Gilbert)

1. يتطلب العمل قطعة من الـ DNA معروفة و معلومة التركيب

2. توسم القطعة بمادة مشعة P32 في نهاية 5' لكل سلسلة.

3. عملية عزل و تنقية للسلاسل المحورة لإنتاج عشيرة من السلاسل الموسومة لتستخدم لاحقاً لتحديد التتابع.

4. يتم تحديد التتابع و ذلك بالتحوير الكيميائي لقواعد سلسلة الـ DNA لتزال لاحقاً بمعدل قاعدة واحدة لكل جزيء باستخدام مواد كيميائية مختلفة، و من ثم تحطم الرابطة الفوسفاتية ثنائية الاستر باستخدام مادة البابردين Piperidine

5. بالنهاية سوف تعطي عدد كبير من الجزيئات لتنتج فيما بعد مجموعة من القطع مختلفة الأطوال بنيكلوتيد و اخذ معلم في النهاية 5'

ddNTPs terminate DNA synthesis.

المحاضرة الثالثة ثانياً: قراءة التتابعات

ثانياً: طريقة سنجر و كولسون الإنزيمية (Sanger-Coulson)

كما أنها تعرف التسلسل عن طريق دي ديوكسي (Dideoxy sequencing)

و ترتكز هذه الطريقة على مفهوم أن شريط DNA في الأساس مبنى من جزيئات من الديوكسي نيوكليوتيد (deoxynucleotides (dNTPs) و يوجد على النقطة الثالثة من حلقة السكر الريبوزي مجموعة مؤكسدة أي مجموعة هيدروكسيل (-OH) و هذه النقطة هي التي ترتبط في النقطة الثالثة من الجزيء الذي يليها و هكذا يتم الترابط لتكوّن شريط طويل من DNA.

و لقد قام د. سنجر بالاستفادة من هذه الخاصية فبدّل الجزيء من (OH) إلى (H) عن طريق إضافة دي ديوكسي نيوكليوتيد (ddNTPs) بدل من ديوكسي نيوكليوتيد (dNTPs) و هذا يؤدي الى توقف ترابط الجزيئات و يكون في طرف كل جزيء نوع واحد من الأحماض النووية.

- الخطوات الأساسية للكشف عن تتابع الجزيئات المكونه للمادة الوراثية بطريقة سنجر و كولسون:
- 1. إضافة قطعة الـ DNA القالب (سلسلة مفردة)
- 2. إضافة البادئ ذي نهاية حرة من نوع 3'-OH
- 3. إضافة dNTPs معلمة إشعاعياً
- 4. إضافة إنزيم البلمرة من نوع Klenow fragment
- 5. قسم الخليط إلى أربعة انابيب متساوية بالحجم
- 6. إضافة الـ ddNTPs حيث يضاف نوع واحد لكل أنبوب.

المحاضرة الثالثة ثانياً: قراءة التتابعات

ثانياً: طريقة سنجر و كولسون الإنزيمية (Sanger-Coulson)

7. وبذلك سيبدأ تخليق شريط جديد أمام كل شريط قديم وسيتوالى ترتيب النيوكليوتيدات الجديدة في بناء الأشرطة الجديدة ولكن عملية بناء أي شريط ستتوقف إذا أخذ جزئ ddNTPs في بناء الشريط الجديد وحدوث هذا الاحتمال الأخير يتم عشوائياً ويؤدي ذلك إلى أن القطع الجديدة ستكون مشعة ومتفاوتة في أطوالها ولكن كل منها ينتهي بالـ ddNTPs في الطرق '3.

و بعد انتهاء التفاعل في الانابيب الاربعة سنحصل على خليط من الـ DNA الجديدة المختلفة الاطوال التي تحتوي جميعاً على نفس النيوكليوتيد في الطرف '5 ولكن تختلف في الطرف '3 حيث قسم منها ينتهي بـ ddATP وقسم اخر بـ ddTTP وهكذا

8. لاحقاً تتم عملية الرحلان الكهربائي و الفصل على هلامة البولي أكريلاميد

9. ثم يتم تصوير الهلام بطريقة الاشعاعي الالي Autoradiography.

1 Reaction mixture

- ▶ Primer and DNA template ▶ DNA polymerase
- ▶ ddNTPs with flouochromes ▶ dNTPs (dATP, dCTP, dGTP, and dTTP)

2 Primer elongation and chain termination

3 Capillary gel electrophoresis separation of DNA fragments

4 Laser detection of flouochromes and computational sequence analysis

Chromatograph

المحاضرة الثالثة

ثانياً: قراءة التتابعات

ثانياً: طريقة سنجر و كولسون الإنزيمية (Sanger-Coulson)

10. تتسم قراءة الهلام او صورة الهلام لتحديد تتابع النيوكليوتيدات بسهولة حيث يتم اولا تحديد

الحزمة المهاجرة لأطول مسافة وهي تمثل اصغر قطعة DNA مخلقة في الخليط، وهذا يعني

ان نمو هذه القطعة قد توقف عند النيكلوتيد الاول للقلاب

◦ اذا اخدنا الشكل التالي كمثال على هذه الحالة نلاحظ ان اصغر حزمة تقع في المجال C الذي

◦ يحتوي على ddCTP مما يعني ان النيكلوتيد الاول في الخيط الجديد هو من نوع C

◦ الخطوة الثانية هي تحديد موقع الحزمة المهاجرة بمسافة اقل من الاولى وتعيين المجال الذي

تحركت فيه والتي تكون اطول من الحزمة الاولى بمقدار نيكلوتيد واحد فقط. كما يلاحظ من

الشكل موقع هذه الحزمة في المجال T ايضا مما يشير الى ان النيكلوتيد الثاني في الخيط الجديد

هو من النوع T

◦ اما الحزمة الثالثة من ناحية مسافة الهجرة فتقع في المجال A الذي يحتوي على ddATP وبهذا

سيكون النيكلوتيد الثالث من نوع A وهكذا تستمر القراءة لتحديد مواقع الحزم ومجال حركتها

لمعرفة تتابع النيوكليوتيدات بالكامل.